
Nome:

08/11/2017

Regras:

- I. Não vires esta página antes do começo da prova.
- II. Nenhuma consulta de qualquer forma.
- III. Nenhum aparelho ligado (por exemplo: celular, tablet, notebook, *etc.*).¹
- IV. Nenhuma comunicação de qualquer forma e para qualquer motivo.
- V. $\forall x(\text{Colar}(x) \rightarrow \neg\text{Passar}(x, \text{FMC2}))$.²
- VI. Use caneta para tuas respostas.
- VII. Responda dentro das caixas indicadas.
- VIII. Escreva teu nome em *cada* folha de rascunho extra, antes de usá-la.
- IX. Entregue *todas* as folhas de rascunho extra, juntas com tua prova.
- X. Nenhuma prova será aceita depois do fim do tempo.
- XI. Os pontos bônus serão considerados apenas para quem conseguir passar sem.³
- XII. Escolha até 3 dos A, B, C, D, E para resolver.⁴

Boas provas!

¹Ou seja, *desligue antes* da prova.

²Se essa regra não faz sentido, melhor desistir desde já.

³Por exemplo, 25 pontos bonus podem aumentar uma nota de 5,2 para 7,7 ou de 9,2 para 10,0, mas de 4,9 nem para 7,4 nem para 5,0. A 4,9 ficaria 4,9 mesmo.

⁴Provas com respostas em mais que 3 partes não serão corrigidas (tirarão 0 pontos).

Lembre-se:

Definição 1 (grupo; grupo abeliano; monóide). Um conjunto estruturado $\mathcal{G} = \langle G ; e, * \rangle$ é um *grupo* sse:

$$(\forall a, b \in G) [a * b \in G] \quad (\text{G0})$$

$$(\forall a, b, c \in G) [a * (b * c) = (a * b) * c] \quad (\text{G1})$$

$$(\forall a \in G) [e * a = a = a * e] \quad (\text{G2})$$

$$(\forall a \in G) (\exists y \in G) [y * a = e = a * y] \quad (\text{G3})$$

Se \mathcal{G} satisfaz as (G0)–(G3) em cima e a

$$(\forall a, b \in G) [a * b = b * a] \quad (\text{G4})$$

chamamos o \mathcal{G} *grupo abeliano*. Denotamos o inverso de $a \in G$ garantido pela (G3) com a^{-1} ou $(-a)$, dependendo se usamos notação multiplicativa ou aditiva para o grupo. Se o \mathcal{G} satisfaz as (G0)–(G2) ele é um *monóide*.

Definição 2 (anel). Um conjunto estruturado $\mathcal{R} = \langle R ; 0, 1, +, \cdot \rangle$ é um *anel* (com identidade) sse:

$$(\forall x, y \in R) [x + y \in R] \quad (\text{A0})$$

$$(\forall x, y, z \in R) [x + (y + z) = (x + y) + z] \quad (\text{A1})$$

$$(\forall x \in R) [0 + x = x = x + 0] \quad (\text{A2})$$

$$(\forall x \in R) (\exists y \in R) [y + x = 0 = x + y] \quad (\text{A3})$$

$$(\forall x, y \in R) [x + y = y + x] \quad (\text{A4})$$

$$(\forall x, y \in R) [x \cdot y \in R] \quad (\text{M0})$$

$$(\forall x, y, z \in R) [x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z] \quad (\text{M1})$$

$$(\forall x \in R) [1 \cdot x = x = x \cdot 1] \quad (\text{M2})$$

$$(\forall x, y, z \in R) [x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z] \quad (\text{DL})$$

$$(\forall x, y, z \in R) [(y + z) \cdot x = y \cdot x + z \cdot x] \quad (\text{DR})$$

Denotamos o inverso de $x \in R$ garantido pela (A3) com $(-x)$. Se a \cdot é comutativa, chamamos o \mathcal{R} *anel comutativo*.

Definição 3. Sejam G grupo $g \in G$, e $A, B \subseteq G$. Definimos

$$gA \stackrel{\text{def}}{=} \{ga \mid a \in A\} \quad AB \stackrel{\text{def}}{=} \{ab \mid a \in A, b \in B\} \quad \dots \text{etc.}$$

Definição 4 (homomorfismo de grupo). Um *homomorfismo* φ do grupo $\langle A ; e_A, \cdot_A \rangle$ para o grupo $\langle B ; e_B, \cdot_B \rangle$ é uma função $\varphi : A \rightarrow B$ tal que:

(i) para todo $x, y \in A$, $\varphi(x \cdot_A y) = \varphi(x) \cdot_B \varphi(y)$;

(ii) $\varphi(e_A) = e_B$;

(iii) para todo $x \in A$, $\varphi(x^{-1}) = (\varphi(x))^{-1}$.

Definição 5 (subgrupo normal). Um subgrupo $N \leq G$ é *subgrupo normal* de G sse

$$N \trianglelefteq G \stackrel{\text{def}}{\iff} \text{para todo } g \in G \text{ e } n \in N, \quad gng^{-1} \in N \\ \iff \text{para todo } g \in G, \quad gN = Ng$$

(18) **A**

Dado um grupo *finito* G e $H \leq G$, definimos \mathcal{C}_H como o conjunto:

$$\mathcal{C}_H \stackrel{\text{def}}{=} \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$$

(9) **A1.** Mostre que $|\mathcal{C}_H| \leq |G|$

PROVA.

(9) **A2.** Mostre que $|\mathcal{C}_H| \leq |G|$.

PROVA.

(32) **B**

Definition. Sejam G grupo e H subgrupo de G sse H é fechado por multiplicação e inversão. Escrevemos $H \triangleleft G$.

(12) **B1.** Sejam G grupo e H subgrupo tal que:

(i) $gHg^{-1} = H$;

(ii) $|G/H| = 2$.

Então $H \triangleleft G$.

PROVA.

(20) **B2.** Sejam G grupo e H um subgrupo de G , tal que H é normal em G . Então $|G/H| = 2$.

PROVA.

(32) C

Definition I [redacted]. Um [redacted] tal que

para todo [redacted] [redacted] ([redacted])

é chamado [redacted].

Definition II [redacted]. Um [redacted] tal que

para todo [redacted], [redacted] ([redacted])

é chamado [redacted].

Fato. As definições I e II são equivalentes.

Definition III [redacted]. Um [redacted] tal que

para todo [redacted], existe [redacted], tal que [redacted]. ([redacted])

é chamado [redacted]

[redacted] Se [redacted] é um [redacted] então [redacted] é um [redacted]

PROVA.

(24) **D**

Definition (homomorfismo de monóide). Sejam $\mathcal{M} = (M; \cdot_M, 1_M), \mathcal{N} = (N; \cdot_N, 1_N)$ monóides e $\varphi : M \rightarrow N$. A φ é um *homomorfismo de monóides* sse:

(i) para todo $x, y \in M$, $\varphi(x \cdot_M y) = \varphi(x) \cdot_N \varphi(y)$;

(ii) $\varphi(1_M) = 1_N$.

(12) **D1.** ██████████ ██████████ $\mathcal{M} = (M; \cdot_M, 1_M), \mathcal{N} = (N; \cdot_N, 1_N)$ monóides ████████████████████
tal que

$$\text{██████████} = \text{██████████} \text{ para todo } \text{██████████}.$$

██████████ é ████████████████████.

PROVA.

(12) **D2.** ██████████ Sejam \mathcal{R}, \mathcal{S} aneis e $f : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{S}$ um homomorfismo de aneis. Prove que ██████████
████████████████████.

PROVA.

(48) **E**

(24) **E1.** Sejam \mathcal{A}, \mathcal{B} [redacted] e $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ [redacted] morfismo. Prove que:

$$\text{[redacted]} \iff \text{[redacted]}.$$

PROVA.

(24) **E2.** Seja G grupo e defina [redacted]. Prove que:

$$\text{[redacted]} \iff \text{[redacted]}.$$

PROVA.

Só isso mesmo.